



Isolement et confirmation des poliovirus

Centre national de référence pour la poliomyélite

Demandeur

Identification du Patient / Étiquette

Nom _____

Prénom _____

Date de naissance _____

Sexe m / f / d

Adresse et no _____

Code postal, Ville _____

Copie des résultats à

Matériel

AFP

- Isolat issu de culture cellulaire
- Selles natives (2 échantillons de selles, intervalle de 24 à 48h)

À usage interne
1. échantillon

1. échantillon

Date du prélèvement _____ . _____ . 20 _____

Heure du prélèvement _____ : _____ h

2. échantillon

Date du prélèvement _____ . _____ . 20 _____

Heure du prélèvement _____ : _____ h

À usage interne
2. échantillon

Anamnèse, données cliniques

Paralysie flasque aiguë (AFP) Oui Non

Localisation de la paralysie: _____

Début de la maladie: _____

Nombre de vaccins administrés contre la polio (OPV + IPV):

Date du dernier vaccin

Oral (OPV): _____ . _____ . 20 _____

Injection (IPV): _____ . _____ . 20 _____

Surveillance de la circulation des poliovirus. Dans le cadre de l'éradication mondiale de la poliomyélite, le laboratoire de référence surveille, pour le compte de l'OFSP et conformément aux directives de l'OMS, la présence de poliovirus dans la population résidante en Suisse. Tous les cas suspects de poliomyélite et tous les cas de paralysie flasque aiguë (Acute Flaccid Paralysis, AFP) doivent être recensés. L'examen est gratuit.