



**Universität
Zürich** ^{UZH}

**Institut für Medizinische Virologie
Nationales Referenzzentrum für Retroviren**
Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich
044 634 26 59, virusdiagnostik@virology.uzh.ch
www.virology.uzh.ch

Demande d'analyse rétrovirale

Demandeur

Médecin traitant:

Téléphone:

Adresse du demandeur:

Résultats via Fax

Copie des résultats à

Identification du Patient / Étiquette:

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Sexe: m / f _____

Adresse et no:

Code postal, Ville:

Numéro AVS:

Traitement ambulatoire hospitalier partiellement hospitalier
Clinique Maladie Accident Grossesse
à facturer au Demandeur Patient Caisse-maladie / Assur.-invalidité

Caisse / Office AI:

Adresse:

Numéro d'asséc.patient:

Matériel du prélèvement:

Sérum Sang/plasma EDTA Liquor cerebrospinalis autres: _____

Date du prélèvement: _____ Heure du prélèvement: _____

Veuillez nous envoyer _____ nouvel emballage _____ formulaires personnalisés

Anamnèse, données cliniques - analyses demandées:

Veuillez marquer les tests désirés. Utilisez le formulaire spécial pour les tests pédiatriques, s.v.p.

Analyses VIH

A. VIH test de dépistage avec confirmation selon les guidelines de test VIH **Échantillon**
 VIH-1/2 dépistage 5e génération (anticorps + antigène p24) Plasma EDTA ou sérum, 2-3 mL

B. VIH: Vérification selon les guidelines de test VIH
 Line Immunoassay VIH-1 & VIH-2 ARN VIH, charge virale VIH test de résistance (PR+RT) Sang EDTA 7-10 mL ou
 VIH test de résistance (IN) Plasma EDTA 2-3 mL

C. Résistance génotypique du VIH aux médicaments antirétroviraux & tropisme CCR5/CXCR4 à partir du plasma (standard) à partir de cellules (provirus)
 VIH-1 PR+RT (= standard) Nouvellement diagnostiqué avant la 1^{ère} thérapie changement de thérapie
 VIH-1 IN intégrase (= standard) Participation dans la SHCS Oui --donnez le code SHCS au verso! Non Sang EDTA 7-10 mL ou
 VIH-1 Env/TM (inhibiteur de fusion) Virémie actuelle _____ copies/mL le _____ (date) Plasma EDTA 2-3 mL ou
 VIH-1 tropisme CCR5/CXCR4 Dernière virémie _____ copies/mL le _____ (date) Liquor cerebrospinalis 1-2 mL
 VIH-2 PR+RT* Thérapie actuelle: Nulle NRTI NNRTI PI INSTI antagoniste corécepteur autres: _____

D. Charge virale (virémie)
 VIH-1 ARN copies/mL, virémie VIH-2 ARN IU/mL, virémie Sang EDTA 7-10 mL ou
 Virémie VIH-1 ou VIH-2 mesurée par le test PERT (test pour la transcriptase inverse) Plasma EDTA 2-3 mL ou
Liquor cerebrospinalis 1-2 mL

E. Tests individuels VIH
 VIH-1/2 dépistage 5e génération VIH-1 + VIH-2 Line Immunoassay VIH-1 antigène p24 (sans dissociat.) Plasma EDTA (sérum) ≥1 mL
 VIH-1 ADN par PCR* VIH-1 groupe O ADN par PCR* VIH-2 ADN par PCR* Sang EDTA 7-10 mL
 VIH-1 ADN par MEGA-PCR 'high-input'* VIH-2 par MEGA-PCR 'high-input'* Sang EDTA 3 x10 mL (!!!)
 VIH-1 ARN, PCR qualitatif* VIH-1 groupe O ARN, PCR qualitatif* VIH-2 ARN, PCR quantitative* Sang EDTA 7-10 mL ou
 Transcriptase inverse par le test PERT, quantitative Plasma EDTA 2-3 mL

F. Actualité du VIH («Recency»): selon les guidelines les échantillons des cas confirmés doivent être transmis au CNR. **Material**
 Actualité du VIH ("Recency") Plasma EDTA (sérum) ≥0.5 mL

Analyses HTLV-1/2
 HTLV-1/2 dépistage anticorps HTLV-1 & HTLV-2 Line Immunoassay/typage de virus Plasma EDTA, (sérum) ≥1 mL
 HTLV-1 ADN, PCR qualitatif* HTLV-1 ADN, PCR quantitative* HTLV-2 ADN, PCR qualitatif* Sang EDTA 7-10 mL

Analyses d'autres rétrovirus
 Dépistage de rétrovirus par le test PERT (détecte tous les rétrovirus) Plasma EDTA 2-3 mL

* = test pas accrédité

Le NZR dispose d'autres analyses non accréditées pour détecter les infections rétrovirales. Celles-ci ne sont effectuées que dans des situations particulières et uniquement si nécessaire par accord. Le répertoire complet des analyses NZR annotées et les explications des tests individuels peuvent être consultés sur <https://www.virology.uzh.ch/de/services/VirusAnalysenID.html>

Ce formulaire peut être téléchargé de <https://www.virology.uzh.ch/de/services/virauftrag.html>

PRISE DES MATERIELS ET ENVOI: 10 ml (MEGA-PCR: 30 ml) de sang EDTA stérile convient pour toutes les analyses.

- Collection dans les Vacutainers EDTA dans nos emballages de transport. Le bouchon doit être perforé par l'aiguille et ne doit en aucun cas être retiré (stérilité!). Les emballages pour le transport contenant les Vacutainers peuvent être obtenus gratuitement sur demande téléphonique: **044 634 29 31**.
- Envoi **par courrier A ("Luna-Express")** — SVP, PAS DE PRISES DE SANG OU ENVOI LES VENDREDIS ET LA VEILLE DES FÊTES!

Inscrire le code SHCS en bas:

